

IKADRYL®

FLU

DIPHENHYDRAMINE HCl, SODIUM CITRATE, AMMONIUM CHLORIDE, PSEUDOEPHEDRINE HCl, PARACETAMOL

May not be given to patient who is sensitive against other sympathomimetic drug (e.g. Ephedrine, Phenylpropanolamine, Phenylephrine), high blood pressure, and to patient who got a therapy with anti depressant hampering Mono Amine Oxydant (MAO) type.

Do not take more then recommended dosage. Precaution for patient with high blood pressure or severe hypertension or stroke, such as patient with over weight or old age patient. If the flu symptom does not reduced in 3 (three) days, tell your doctor or health service unit. Stop using this medicine if the patient becomes insomnia, the heart pounded and dizzy.

COMPOSITION

One measuring spoon (5 ml) contains:

Diphenhydramine HCl.....	12,5 mg
Na citrate.....	50 mg
Ammonium chloride.....	125 mg
Pseudoephedrine HCl.....	15 mg
Paracetamol.....	150 mg

ACTION OF DRUG

Analgesic - antipyretic, expectorant, antihistamine and decongestant.

INDICATIONS

Relief of flu symptom like fever, dizzy, nasal congestion, sneezing and coughing.

CONTRAINDICATIONS

- See box warning.
- Patient who is hypersensitive with the component of this drug.
- Patient with heavy liver function disturbance.
- Patient with heart disturbance and diabetic mellitus.

DOSAGE

Adults: 2 spoons (10 ml) 3 times daily.

Children 6 - 12 years : 1 spoon (5 ml) 3 times daily.

SIDE EFFECTS

- Drowsiness, digestion disturbance, headache, insomnia, nervousness, excitation, tremor, tachycardia, ventricular arrhythmias, dry mouth, palpitations, urinary retention.
- High dosage and long term treatment may cause liver dysfunction.

WARNINGS AND PRECAUTIONS

- See box warning.
- Precautions for patient with liver dysfunction and kidney, glaucoma, hypertrophy prostate, hyperthyroidism, heart disorder and diabetic mellitus.
- Not recommended for children under 6 years old, pregnancy, lactation, exception under doctor's advice.
- During taking this medicine may not drive or operate machinery.
- Cautions when taken this medicine together with other drugs which enhance sedative effect of CNS depressants.
- Cautions for patient consuming alcohol can increase the risk of liver dysfunction.

DRUG INTERACTION

Using together with antidepressant type hampering MAO may potentially increase the risk of critical hypertension.

STORAGE

Keep at room temperature (25 - 30 °C).

PACKING

Box, bottle 60 ml.

Box, bottle 100 ml.

Box, bottle 120 ml.

Included with measuring spoon (5 ml).

**P No.1
WARNING
See leaflet for instruction**

Reg. No. : DTL1009320137A1

Produced by :



PT. IKAPHARMINDO PUTRAMAS
PHARMACEUTICAL LABORATORIES
JAKARTA - INDONESIA

IKADRYL®

FLU

DIFENHIDRAMIN HCl, NATRIUM SITRAT, AMONIUM Klorida, PSEUDOEFEDRIN HCl, PARASETAMOL

Tidak boleh diberikan pada penderita yang peka terhadap obat simpatomimetik lain (misal efedrin, fenilpropanolamin, fenilefrin), penderita tekanan darah tinggi berat, dan yang mendapat terapi obat anti depresan tipe penghambat Monoamin Oksidase (MAO). Tidak boleh melebihi dosis yang dianjurkan. Hati-hati penggunaan pada penderita tekanan darah tinggi atau yang mempunyai potensi tekanan darah tinggi atau stroke, seperti pada penderita dengan berat badan berlebih (over weight) atau penderita usia lanjut. Bila dalam 3 hari gejala flu tidak berkurang segera hubungi dokter atau unit pelayanan kesehatan. Hentikan penggunaan obat ini jika terjadi susah tidur, jantung berdebar dan pusing.

KOMPOSISI

Tiap 1 sendok takar (5 ml) mengandung :

Difenhidramin HCl.....	12,5 mg
Natrium Sitrat.....	50 mg
Amonium Klorida.....	125 mg
Pseudoefedrin HCl.....	15 mg
Parasetamol.....	150 mg

CARA KERJA OBAT

Bekerja sebagai analgesik-antipiretik, ekspektoran, antihistamin dan dekonjestan.

INDIKASI

Untuk meringankan gejala-gejala flu seperti demam, sakit kepala, hidung tersumbat dan bersin-bersin yang disertai batuk.

KONTRA INDIKASI

- Lihat Box Warning
- Penderita yang hipersensitif terhadap komponen obat ini.
- Penderita dengan gangguan fungsi hati yang berat.
- Penderita dengan gangguan jantung dan diabetes mellitus.

DOSIS

Dewasa : 2 sendok takar (10 ml), 3 x sehari.

Anak-anak 6 - 12 tahun : 1 sendok takar (5 ml), 3 x sehari.

EFEK SAMPING

- Mengantuk, gangguan pencernaan, sakit kepala, insomnia, gelisah, eksitasi, tremor, takikardi, aritmia ventrikuler, mulut kering, palpitasi, sulit berkemih.
- Penggunaan dosis besar dan jangka panjang menyebabkan kerusakan hati.

PERINGATAN DAN PERHATIAN

- Lihat kotak peringatan.
- Hati-hati penggunaan pada penderita dengan gangguan fungsi hati dan ginjal, glaukoma, hipertrofi prostat, hipertiroid, gangguan jantung dan diabetes mellitus.
- Tidak dianjurkan untuk anak di bawah 6 tahun, wanita hamil dan menyusui, kecuali atas petunjuk dokter.
- Selama minum obat ini tidak boleh mengendarai kendaraan bermotor atau menjalankan mesin.
- Hati-hati penggunaan bersamaan dengan obat-obat lain yang menekan susunan saraf pusat.
- Penggunaan pada penderita yang mengkonsumsi alkohol dapat meningkatkan resiko kerusakan fungsi hati.

INTERAKSI OBAT

Penggunaan bersama antidepresan tipe penghambat MAO dapat mengakibatkan krisis hipertensi.

CARA PENYIMPANAN

Simpan pada suhu kamar (25 - 30 °C).

KEMASAN

Dus, Botol 60 ml.

Dus, Botol 100 ml.

Dus, Botol 120 ml.

Dilengkapi 1 sendok takar (5 ml).

**P No. 1
Awat ! Obat Keras
Bacalah aturan pemakaianya**

No. Reg. : DTL1009320137A1

Diproduksi oleh :



PT. IKAPHARMINDO PUTRAMAS
PHARMACEUTICAL LABORATORIES
JAKARTA - INDONESIA